

不眠症でガイドライン
睡眠薬の併用避けて
改善後、ゆっくり減量

医療 新世紀

成人の10人に1人が悩むといわれる不眠症。医療現場での睡眠薬使用は増えているが「飲むのは不安」という声も多い。そこで、睡眠薬を賢く安全に使うためのガイドライン(指針)を厚生労働省 研究班と日本睡眠学会が作成した。特徴は「症状が改善したらこまめに薬をやめる」と治療の「出口」を明示した点。薬以外の治療も紹介してあり、睡眠学会のホームページで入手できる。

「飲むのは不安」という声も多い。そこで、睡眠薬を賢く安全に使うためのガイドライン(指針)を厚生労働省 研究班と日本睡眠学会が作成した。特徴は「症状が改善したらこまめに薬をやめる」と治療の「出口」を明示した点。薬以外の治療も紹介してあり、睡眠学会のホームページで入手できる。

不眠症でガイドライン

指針は、不眠症と睡眠薬に関する代表的な質問を40のQ&Aにまとめて解説。寝付きが悪いか、途中で目が覚めやすいかといった不眠症のタイプや年齢、持病などに応じて適した薬の種類を例示する

指針は、不眠症と睡眠薬に関する代表的な質問を40のQ&Aにまとめて解説。寝付きが悪いか、途中で目が覚めやすいかといった不眠症のタイプや年齢、持病などに応じて適した薬の種類を例示する

睡眠薬の併用避けて

に支障が出るのがポイント。適度な運動や規則正しい食生活、就寝前のカフェイン飲料は避けるなど、生活を見直してもなお不眠が一カ月程度続く場合、睡眠薬の処方应考虑される。

とともに、副作用を最小限にするため、就寝直前に飲み、複数の睡眠薬併用はできるだけ避けるよう強調している。

薬のやめ方については、不眠症が治ったと判断するタイミングを

薬の減量は、治ったと判断した時点で4分の1減らし、1〜2週間様子を見てまた4分の1減量と、時間をかけることで不眠のぶり返しなどの不快な症状を予防できるとしている。

なぜ今こうした指針が必要なのか。背景には睡眠薬使用の増加がある。「患者の1日当たりの服用量、多剤併用率ともにじわじわ増えている。難治性の患者の増加も考えられるが、漫然と飲み続ける

人がいる可能性も否定できない」と三島さんは指摘する。

一方で日本人は諸外国と比べ、睡眠薬への不安が強いことが明らかになっている。三島さんの調査でも一般市民の44%が「依存性

は「指針の最大の狙いは、薬を必要とする患者が安心して飲めるよう治療の道筋を示し、慢性化防止に役立つこと」と話す。

長さより密度

指針はまた、薬以外の有効な治療法として一部の専門施設が取り組んでいる「認知行動療法」を紹介。専門医による50分程度のカウンセリングを4〜8回繰り返して、不眠につながる患者の行動パターンや考え方を直していきものだが、健康保険がきかないことが普及のネックになっている。

そこで、認知行動療法のエッセンスも取り

「良い眠り」のための心得

- 眠くなるまで布団に入らない
- 昼寝はなるべくしない。するならば午後3時まで30分以内
- 「何時間眠ったか」より「日中元気に過ごせるか」が大事
- 起床時間は毎日同じに
- 寝酒は睡眠にメリットなし
- 睡眠薬は服用正しくすれば安全。自己判断せず主治医と相談を

※三島和夫さんによる

がありやめられなくなるとの印象を持っていた。こうした不安から自己判断で薬をやめ、不眠症を慢性化させてしまっ例も後を絶たないという。不眠症は慢性化すると治療が難しくなる。三島さん

改善後、ゆっくり減量を

込んだ「良い眠り」のための心得を三島さんに尋ねた。第一は、眠くなるまで布団に入らないことだ。不眠症の人には音楽を聴いたり本を読んだり、寝室内で眠れずに苦しむ傾向がある。その習慣を断つことが重要な一歩です。

長く寝るより睡眠の密度を濃くする。そのため昼寝はなるべく控え、するならば午後3時まで、30分以内にとどめる。毎朝同じ時間に起きるのも有効だ。寝酒は「夜中に目が覚めやすくなるため睡眠には逆効果」ということ

も覚えておきたい。

(共同)